



JE VOUDRAIS QUE MA CHIENNE AIE DES PETITS.

A partir de quel âge peut-elle avoir des petits?

Il est préférable d'attendre l'apparition des deuxièmes chaleurs c-à-d environ 10-14 mois pour les petites races et 18-24 mois pour les grandes races.

Quel jour devra se faire la saillie?

Entre le 9 et 13^{ème} jour, la chienne sera saillie deux fois à 48h d'intervalle. Noter sur un calendrier le jour des premières pertes. Il existe une méthode plus exacte qui consiste à vérifier que le taux sérique de progestérone est suffisant. Pour ce faire une prise de sang sera effectuée, sur r-d-v, le matin du 10^{ème} jour. La saillie se fera le soir même si le résultat est positif. (frais de laboratoire:).

Dois-je préférer l'insimination artificielle à la naturelle?

L'IA permet la vérification de la semence; elle sera préconisée chaque fois que, pour une raison ou une autre, le mâle ne peut couvrir la femelle avec succès. Cette pratique de plus en plus courante est réalisée, si possible, en présence des deux animaux concernés et de leurs propriétaires.

Quelles précautions dois-je encore prendre?

Faire un rappel complet des vaccinations, si possible une dizaine de jours avant la saillie, pour garantir aux chiots une protection immunitaire optimale.

Vermifuger la chienne à cette époque également.

Ne pas augmenter la ration alimentaire durant le premier mois de gestation.

Quand la gestation peut-elle être confirmée?

Entre le 23 et 28^{ème} jour par palpation abdominale dès le 23 par écho après le 45^{ème} jour par radio

Bonne chance

Nathalie et Dominique

